



CAN – Centraförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Box 70412, 107 25 Stockholm

Telefon 08-412 46 00, Fax 08-10 46 41, can@can.se, www.can.se

2005-05-20

PRESSMEDDELANDE

Narkotikaerfarenheten minskar bland äldre tonåringar

Det visar CANs senaste rapport om mänstrandes drogvanor. Under 1990-talet och under 2000-talets början ökade andelen 18-åriga män som någon gång prövat narkotika och nådde en topp om 18% 2002. Denna siffra har nu minskat två år i rad och uppgick till 15% 2004. Detta innebär att den nedåtgående trend som noterats i CANs årliga undersökning i årskurs 9 alltsedan 2001 nu bekräftas även bland lite äldre tonåringar. Att ha prövat narkotika är vanligast bland personer som bor i storstadslänen eller i Jämtlands län, bland dem som inte studerar eller arbetar, liksom bland personer med utländsk bakgrund.

Även den mer aktuella/regelbundna användningen har minskat i omfattning och 2004 svarade 2% att de använt narkotika de senaste 30 dagarna före undersökningen och 9% att de gjort så de senaste 12 månaderna.

Tolv procent dricker överhuvudtaget inte alkohol

Under 1990-talet ökade även alkoholvanorna i omfattning bland mänstrande men sedan år 2000 har trenden brutits, och förändringen kan möjligen tolkas som nedåtgående då andelen som inte dricker alls ökat något samtidigt som berusningsdrickandet sjunkit en aning. År 2004 svarade 13% att de berusar sig åtminstone någon gång i veckan.

Berusningsvanorna tenderade att vara mer omfattande än snittet bland storstadsbor (samtidigt som nykteristerna också var många där), bland dem som inte studerade, samtidigt som de var klart mindre omfattande hos utlandsfödda mänstrande.

Allt färre röker

År 2004 svarade 23% att de röker, varav en tredjedel dagligen. Samma år snusar 33%, varav tre fjärdedelar varje dag. Sedan 2000, då tobaksfrågor infördes, har rökningen minskat (från 27%) medan snusningen varit relativt oförändrad. Grupperna överlappar delvis varandra då 15% både röker och snusar 2004.

Erfarenheten av dopning och sniffning oförändrat låg

Andelen som någon gång använt anabola steroider har legat på 1% alltsedan 1994 och andelen som sniffat har legat runt 6% sedan 2000.

Om undersökningen

I samband med de teoretiska proven besvarar de mänstrande ett kortfattat frågeformulär om droger. Detta sker anonymt och efter avslutat ifyllande lägger respondenten själv sin blankett i en uppsamlingslåda. Rikstäckande studier av mänstrandes drogvanor har genomförts årligen sedan 1970 och hittills har över 1 400 000 personer deltagit. Handikappade, kroniskt sjuka och personer utan svenskt medborgarskap mönstrar inte.

Mönstrandes drogvanor 2004 (CAN-rapport nr 86) kan beställas via växel eller www.can.se. På hemsidan finns även en sammanfattning att ladda ner.

Ulf Guttormsson är ansvarig för rapporten och nås på 08-412 46 19 eller ulf.guttormsson@can.se.