



CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Klara Norra Kyrkogata 34, Box 70412, 107 25 Stockholm

Telefon 08-412 46 00, Fax 08-10 46 41, can@can.se, www.can.se

2008-07-07

PRESSMEDDELANDE

CAN i Almedalen

Tidigare positiva drogtrender har inte fortsatt 2008

Den positiva trend som har funnits några år när det gäller alkoholkonsumtionen bland elever i årskurs 9, och då i första hand bland pojkarna, har brutits – åtminstone temporärt. Narkotikaerfarenheten är relativt oförändrad, medan det finns en nedåtgående trend när det gäller snusningen. Detta är några av de viltigaste resultaten i CANs undersökning 2008 av skolelevs drogvanor.

– Vissa positiva trender har visserligen inte fortsatt 2008, men det är för tidigt att säga om detta är temporära trender eller början på några nya trender, konstaterar Thomas Hvitfeldt, forskningssekreterare på CAN.

Alkohol: Tidigare nedåtgående trend i årskurs 9 har inte fortsatt

Sedan millennieskiftet har det funnits en nedåtgående trend när det gäller alkoholvanorna bland elever i årskurs 9. Den har varit tydligast bland pojkarna, men i årets undersökning finns inga tecken på en fortsatt minskning. Vissa värden på alkoholkonsumtionen är någon eller några procentenheter högre i år, men det är för tidigt att säga om detta är ett temporärt trenderbrott eller om vi har sett början på en förändring.

Bland eleverna i år 2 i gymnasiet har alkoholkonsumtionen varit relativt oförändrad sedan undersökningarna startade 2004.

Narkotika: Relativt oförändrat

Även när det gäller narkotikaerfarenheten har det funnits en minskningstrend sedan millennieskiftet bland elever i årskurs 9. Årets värden är relativt oförändrade och visar att 7% av pojkarna och 5% av flickorna har svarat att de använt narkotika, vilket nästan uteslutande gäller cannabis. Bland eleverna i år 2 i gymnasiet har narkotikasiffrorna varit relativt oförändrade sedan 2004. I årets undersökning var det 17% av pojkarna och 15% av flickorna som svarade att de använt narkotika, vilket för flickornas del är ett något högre värde än 2007. Även i gymnasiet är cannabis det i särklass vanligaste preparatet.

Tobak: Minskningstrend för snus

Under senare år har det blivit något fler pojkar i årskurs 9 som röker, medan flickornas värden varit relativt oförändrade (dock på en högre nivå än pojkarnas). Däremot har det under senare år blivit färre pojkar som snusar. En liknande trend finns även bland flickorna, fast på en betydligt lägre nivå.

Även i år 2 i gymnasiet har det blivit färre pojkar som snusar, medan tobaksvanorna i övrigt har varit relativt oförändrade bland gymnasieeleverna.

Sniffning: Minskningstrend

Bland eleverna i årskurs 9 och bland pojkarna i år 2 på gymnasiet finns under senare år en trend mot att det blivit färre som har erfarenhet av sniffning. I båda årskurserna är det 2008 ca 5% av eleverna som uppger att de sniffat någon gång.

Bakgrund

Drogvaneundersökningarna genomförs årligen bland elever i årskurs 9 sedan 1971 och i år 2 i gymnasiet sedan 2004. Undersökningarna genomförs som anonyma gruppenkäter i klassrummen på riksrepresentativa urval av klasser. I 2008 års undersökning deltog ca 4 900 elever i årskurs 9 och ca 4 000 elever i gymnasiet.

Ytterligare information: Thomas Hvitfeldt, 08-412 46 09

Några resultat från skolundersökningarna i årskurs 9. Procent.

Pojkar																	
År	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
Alkohol																	
Alkoholkonsumenter	79	78	80	77	75	76	74	74	77	76	74	70	69	68	64	61	63
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år) ^{a)}	33	31	32	28	30	32	39	42	53	48	41	38	41	35	36	30	32
Intensivkonsumtion ^{b)} någon gång/ månad eller oftare	29	30	30	29	30	29	29	30	31/34	30	28	25	26	25	23	23	25
Narkotika																	
Har haft möjlighet att prova narkotika ^{c)}	13	14	14	17	17	22	25	26	27	27	28	25	26	21	19	20	19
Använt narkotika	5	5	5	7	8	8	9	9	10	10	8	7	7	7	7	6	7
Använt narkotika senaste 30 dagarna ^{d)}	2	1	1	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	4	2	2
Anabola steroider ^{e)}	-	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2
Sniffning ^{d)}	7	9	8	12	11	10	10	13	11	8	9	8	8	7	7	5	5
Tobak																	
Rökare ^{f)}	22	20	17	19	19	17/28	28	30	29	30	25	20	18	19	19	20	22
Snusare ^{f)}	19	17	19	19	17	17/21	20	23	26	27	25	24	21	20	20	17	16
Flickor																	
År	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08
Alkohol																	
Alkoholkonsumenter	77	77	79	78	78	78	80	78	79	79	75	75	73	70	66	67	66
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år) ^{a)}	15	17	18	19	17	20	26	26	29	28	31	29	30	32	28	22	25
Intensivkonsumtion ^{b)} någon gång/ månad eller oftare	18	22	24	24	20	23	22	22	23/24	25	24	23	23	23	22	23	24
Narkotika																	
Har haft möjlighet att prova narkotika ^{c)}	14	16	15	23	20	26	26	24	26	25	24	23	22	22	19	20	19
Använt narkotika	3	5	4	5	7	7	6	7	8	9	8	7	7	7	5	5	5
Använt narkotika senaste 30 dagarna ^{d)}	1	1	1	1	2	1	3	2	2	2	2	2	3	3	3	1	1
Anabola steroider ^{e)}	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Sniffning ^{d)}	4	5	6	7	7	7	6	10	8	8	7	6	6	8	6	4	4
Tobak																	
Rökare ^{f)}	27	26	29	27	25	25/37	34	36	36	36	34	30	30	30	26	30	28
Snusare ^{f)}	0	0	1	1	1	1/3	2	3	4	5	5	6	8	6	7	5	4

a) Från och med 2000 ingår frågor om blanddrycker i beräkningen.

b) Intensivkonsumtion = Halv ½-flaska sprit (1989–2000: ½-flaska) eller 1 helflaska vin eller fyra burkar starköl eller fyra burkar blanddrycker eller sex burkar folköl vid samma tillfälle.

c) Värdena är beräknade på dem som aldrig provat narkotika.

d) Frågan omformulerad 2007.

e) Frågan omformulerad 2004.

f) Frågan omformulerad 1997.

Några resultat från skolundersökningarna i gymnasiet, år 2. Procent.

Pojkar					
År	04	05	06	07	08
Alkohol					
Alkoholkonsumenter	86	85	87	83	84
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år)	68	69	71	76	69
Intensivkonsumtion ^{a)} någon gång/månad eller oftare	49	50	51	52	52
Narkotika					
Har haft möjlighet att prova narkotika ^{b)}	37	36	37	36	32
Använt narkotika	17	17	16	17	17
Använt narkotika senaste 30 dagarna	5	6	5	4	4
Anabola steroider	2	2	1	2	1
Sniffning ^{c)}	6	8	8	6	5
Tobak					
Rökare	32	31	33	36	34
Snusare	32	30	31	28	25

Flickor					
År	04	05	06	07	08
Alkohol					
Alkoholkonsumenter	89	86	86	85	84
Totalkonsumtion (dl 100% alkohol/år)	39	41	40	42	40
Intensivkonsumtion ^{a)} någon gång/månad eller oftare	39	43	42	44	44
Narkotika					
Har haft möjlighet att prova narkotika ^{b)}	36	33	34	31	31
Använt narkotika	14	13	14	13	15
Använt narkotika senaste 30 dagarna	2	3	2	2	2
Anabola steroider	0	1	0	1	0
Sniffning ^{c)}	5	5	5	4	5
Tobak					
Rökare	38	41	40	41	41
Snusare	9	11	11	11	9

a) Intensivkonsumtion = Halv ½-flaska sprit eller 1 helflaska vin eller fyra burkar starköl eller fyra burkar blanddrycker eller sex burkar folköl vid samma tillfälle.

b) Värdena är beräknade på dem som aldrig provat narkotika.

c) Frågan omformulerad 2007.