

Skolelevers drogvanor 2009


Diagram 1–21

Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer.

Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och därmed uppfattas som avsändare.




Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1971–2009.




Beräknad genomsnittlig årskonsumtion i liter alkohol 100% i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1977–2009 (1977–1989 avser skattade värden).

Liter




Beräknad genomsnittlig årskonsumtion av respektive alkoholdryck mätt i dl ren alkohol 100% i årskurs 9 bland pojkar. 1989–2009.

Deciliter




Beräknad genomsnittlig årskonsumtion av respektive alkoholdryck mätt i dl ren alkohol 100% i årskurs 9 bland flickor. 1989–2009.

Deciliter




Olika dryckers andel av den totala alkoholkonsumtionen bland elever i gymnasiets år 2, efter kön. 2009.

Pojkar, gy 2




Flickor, gy 2




- Sprit
- Vin
- Blanddrycker
- Starköl
- Folköl



Andelen elever i årskurs 9 som druckit hemtillverkad sprit ("hembränt") respektive smuggelsprit under de senaste 12 månaderna, efter kön. 1991–2009.




Andelen elever i gymnasiets år 2 som druckit hemtillverkad sprit ("hembränt") respektive smuggelsprit under de senaste 12 månaderna, efter kön. 2004–2009.




Andelen elever som intensivkonsumerar alkohol någon gång i månaden eller oftare i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1972–2009.

Procent




Andelen elever som varit berusade vid 13 års ålder i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 2000–2009.

Procent



Sambandet mellan alkoholkonsumtion och vissa andra alkoholvariabler liksom konsumtion av andra medel. Årskurs 9 (samtliga elever). 2009.

Procent




- A** Dricker sprit 2 ggr/mån el. oftare
B Intensivkons 1 g/mån eller oftare
C Berusningsdebut 13 år el tidigare
D Druckit hembränt senaste 12 mån

- E** Använt läkemedel med alkohol
F Röker och/eller snusar
G Har sniffat
H Använt narkotika



Sambandet mellan alkoholkonsumtion och vissa andra alkoholvariabler liksom konsumtion av andra medel. Gymnasiets år 2 (samtliga elever). 2009.

Procent




A Dricker sprit 2 ggr/mån el. oftare
B Intensivkons 1 g/mån eller oftare
C Berusningsdebut 13 år el tidigare
D Druckit hembränt senaste 12 mån

E Använt läkemedel med alkohol
F Röker och/eller snusar
G Har sniffat
H Använt narkotika




Genomsnittskonsumtion i dl alkohol 100% i olika regioner i Sverige. Årskurs 9. Medeltal för perioden 2007–2009.

Deciliter




Genomsnittskonsumtion i dl alkohol 100% i olika regioner i Sverige. Gymnasiets år 2. Medeltal för perioden 2007–2009.




Andelen rökare i årskurs 9, efter kön. 1974–1997.

Procent




Andelen rökare i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1997–2009.

Procent




Andelen snusare i årskurs 9, efter kön. 1974–1997.

Procent




Andelen snusare i årskurs 9 och gymnasiets år 2, efter kön. 1997–2009.




Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 som någon gång använt narkotika, efter kön. 1971–2009.

Procent




Andelen elever i årskurs 9 bland dem som aldrig använt narkotika som "haft möjlighet att pröva" samt "haft lust att pröva". 1971–1982 och 1986–2009.



Erfarenhet av sniffning bland elever i årskurs 9, efter kön. 1971–2009.

Procent



Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika, efter kön. Medeltal i olika regioner i Sverige för perioden 2006–2009.

Procent

