

Skolelevers drogvanor 2010


Diagram 1–22

Det är tillåtet att spara en kopia av bilderna och använda valfritt antal i egna presentationer.

Det är inte tillåtet att på något sätt förändra bilderna om CANs logotyp finns med och därmed uppfattas som avsändare.




Andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1971–2010.




Beräknad genomsnittlig årskonsumtionen i liter alkohol 100% i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1977–2010. (1977–1989 avser skattade värden).


Liter



Beräknad genomsnittlig årskonsumtion av respektive alkoholdryck mätt i dl ren alkohol 100% i årskurs 9 bland pojkar. 1989–2010.




Beräknad genomsnittlig årskonsumtion av respektive alkoholdryck mätt i dl ren alkohol 100% i årskurs 9 bland flickor. 1989–2010.




Olika dryckers andel av den totala alkoholkonsumtionen bland elever i gymnasiets årskurs 2, efter kön. 2010.

Pojkar, gy 2




Flickor, gy 2




- Sprit
- Vin
- Blanddrycker
- Starköl
- Folköl

Andelen elever i årskurs 9 som druckit hemtillverkad sprit ("hembränt") respektive smuggelsprit under de senaste 12 månaderna, efter kön. 1991–2010.




Andelen elever i gymnasiets årskurs 2 som druckit hemtillverkad sprit ("hembränt") respektive smuggelsprit under de senaste 12 månaderna, efter kön. 2004–2010.




Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som intensivkonsumerar någon gång i månaden eller oftare, efter kön. 1972–2010.

Procent




Andelen elever som varit berusade vid 13 års ålder i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1989–2010.

Procent



Sambandet mellan alkoholkonsumtion och vissa andra alkoholvariabler liksom konsumtion av andra medel. Årskurs 9 (samtliga elever). 2010.

Procent




A Dricker sprit 2 ggr/mån el. oftare
 B Intensivkons 1 g/mån eller oftare
 C Berusningsdebut 13 år el tidigare
 D Druckit hembränt senaste 12 mån

E Använt läkemedel med alkohol
 F Röker och/eller snusar
 G Har sniffat
 H Använt narkotika



Sambandet mellan alkoholkonsumtion och vissa andra alkoholvariabler liksom konsumtion av andra medel. Gymnasiets årskurs 2 (samtliga elever). 2010.

Procent




A Dricker sprit 2 ggr/mån el. oftare
 B Intensivkons 1 g/mån eller oftare
 C Berusningsdebut 13 år el tidigare
 D Druckit hembränt senaste 12 mån

E Använt läkemedel med alkohol
 F Röker och/eller snusar
 G Har sniffat
 H Använt narkotika




Genomsnittskonsumtion i deciliter alkohol 100% i olika regioner i Sverige. Årskurs 9. Medeltal för perioden 2008–2010.

Deciliter




Genomsnittskonsumtion i deciliter alkohol 100% i olika regioner i Sverige. Gymnasiets årskurs 2. Medeltal för perioden 2008–2010.




Andelen rökare i årskurs 9, efter kön. 1974–1997.

Procent




Andelen rökare i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1997–2010.

Procent




Andelen snusare i årskurs 9, efter kön. 1974–1997.


Procent



Andelen snusare i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2, efter kön. 1997–2010.




Andelen elever i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 som någon gång använt narkotika, efter kön. 1971–2010.




Andelen elever i årskurs 9 som någon gång använt narkotika, efter kön. Medeltal i olika regioner i Sverige för perioden 2008–2010.

Procent




Andelen elever i gymnasiets årskurs 2 som någon gång använt narkotika, efter kön. Medeltal i olika regioner i Sverige för perioden 2008–2010.

Procent



Andelen elever i årskurs 9 bland dem som aldrig använt narkotika som "haft möjlighet att pröva" samt "haft lust att pröva". 1971–1982 och 1986–2010.



Erfarenhet av sniffning bland elever i årskurs 9, efter kön. 1971–2010.

Procent

